

HANKA 5.3

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso

**Biostimolante ad azione su pianta che favorisce
l'assorbimento degli elementi nutritivi**

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	2,4 %
Carbonio (C) organico	14 %
Ossido di potassio (K ₂ O)	6 %
Betaine	5,3%

*stimola l'accrescimento e lo sviluppo
delle radici
favorisce il superamento degli stress
post trapianto e un miglior attecchimento*

Materie prime: prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione, prodotti a base di alghe ottenuti direttamente mediante estrazione alcalina, borlande non estratte con sali ammoniacali.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE	
Aspetto	Liquido bruno
pH (20 °C)	6.0 – 6.5
densita' a 20 °c	1,22 – 1,28

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

L'effetto sinergico generato dalla combinazione fra i componenti organici delle alghe brune (sp. *Ascophyllum nodosum*) e gli estratti vegetali presenti in HANKA 5.3, aumenta sensibilmente le già note caratteristiche biostimolanti delle prime; tale estratto è infatti ricchissimo di aminoacidi liberi, oligosaccaridi, enzimi, lieviti. Aminoacidi, acido alginico e mannitolo sono degli efficienti agenti chelanti naturali esercitando un'importante azione veicolante, permettono un più rapido assorbimento e trasporto degli elementi nutritivi all'interno della pianta. L'applicazione del prodotto fin dalle prime fasi di crescita favorisce: - Lo sviluppo dell'apparato radicale e quindi la capacità di assorbimento degli elementi nutritivi (effetto auxinico); - L'aumento della massa fogliare e quindi della capacità fotosintetica; - La formazione dei fiori ed i processi di allegagione; - La crescita dei frutti e la qualità della produzione. HANKA 5.3 si applica di preferenza per via fogliare.

Stimola il metabolismo e attiva lo sviluppo fisiologico delle piante (crescita fogliare e radicale, ingrossamento e qualità dei frutti, aumento del tenore degli zuccheri).

Migliora la resistenza agli stress abiotici.

Accellera i processi di degradazione delle molecole inorganiche nei tessuti vegetali.

Fornisce vigore alla pianta favorendo le attività enzimatiche.

DOSI E APPLICAZIONI

FRUTTICOLTURA 250-400 g/hl Pre fioritura, dopo stress termici ed idrici, dopo grandine, durante ingrossamento e maturazione frutti. Intervallo di applicazione 15-20 giorni
 UVA DA TAVOLA 300-400 g/hl Pre fioritura, allegagione, accrescimento acini, pre invaiatura, invaiatura
 UVA DA VINO 300-400 g/hl Pre fioritura, allegagione, inizio accrescimento acini, inizio invaiatura
 OLIVICOLTURA 250-400 g/hl Mignolatura
 ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO 300-400 g/hl Al trapianto o post emergenza, prefioritura, maturazione frutti
 ORTICOLTURA IN SERRA 300-400 g/hl Al trapianto, prefioritura, maturazione frutti
 FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI 250-350 g/hl A trapianto, pre e post fioritura, invaiatura frutti
 PIANTE ORNAMENTALI, FLORICOLTURA 250-350 g/hl Al trapianto e durante il ciclo colturare ad intervalli di 15-20 giorni
 VIVAIO 350-400 g/hl Da inizio ciclo ogni 15-20 giorni
 BARBATELLE VITE 300-500 g/hl Bagno pre-trapianto
Fertirrigazione: distribuire il prodotto alla concentrazione dello 0,5-2‰
Trattamenti al seme: immergere i semi in soluzione al 2-3‰ prima della semina

MISCIBILITÀ

Non miscelare con composti rameici, zolfi, oli minerali; evitare miscele con composti a forte reazione ossidante e riducente. In abbinamento con altri formulati, si consiglia di effettuare sempre piccole prove di saggio.

Agitare prima dell'uso

Condizioni di magazzinaggio



Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente

In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia
 Tenere fuori dalla portata dei bambini



SOLO PER USO PROFESSIONALE

Peso netto Kg xxx

Lotto: xxxxx

IMBALLO

	<p>1 PALLET TANICA 6Kg 30 SCATOLE = 120 T=720 Kg 1 PALLET TANICA 25 Kg 32 T= 800 Kg</p>			
<p>TANICA 6Kg - 25Kg</p>		<p>IBC 1250 Kg</p>		