JIRISAN VEG

ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE BRUNE

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	4,4 %
Carbonio (C) organico	12,5 %
Sostanza organica vegetale 22 %; glicinbetaina 15 %	

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

favorisce lo sviluppo vegetativo della pianta
migliora assorbimento radicale dei nutrienti associati o presenti nel terreno
apporta sostanza organica al terreno

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
DENSITà	1,10 – 1,20
pH	4.8 – 6.0

Caratteristiche

JIRISAN VEG è un estratto di Ascophyllum nodosum (contenente i precursori di ormoni vegetali quali auxine e citochinine) che promuovono la crescita, lo sviluppo e la differenziazione di cellule e tessuti vegetali.
JIRISAN VEG risulta facilmente assorbibile dalle piante entro poche ore dall'applicazione. La presenza di acidi alginici degli estratti algali formano un sottile film sulla superficie delle foglie, massimizzando l'assorbimento di sostanze nutritive.
In miscela con gli erbicidi è in grado di massimizzare l'efficacia dell'intervento, veicolando in modo efficiente le varie sostanze attive nella pianta, riducendone gli stress..

- **veicola i macro e micronutrienti e ne facilita l'assorbimento;**
- **favorisce la crescita e lo sviluppo della pianta anche in condizioni di luce e temperatura non ottimali**
- **stimola la sintesi delle proteine**

FERTIRRIGAZIONE

COLTURE	DOSI	MODALITA' APPLICAZIONE
Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno.	5-10 Kg /HA	3-4 applicazioni durante il ciclo di sviluppo.
Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc.	10-20 Kg /HA	3-4 applicazioni durante il ciclo di sviluppo.
Ornamentali e floricole.	5 Kg/hl	Totalizzare minimo 3-4 interventi durante il ciclo di sviluppo.

FOGLIARE

COLTURE	DOSI	MODALITA' APPLICAZIONE
Colture arboree: vite da vino e da tavola, drupacee, pomacee, agrumi, olivo, melograno.	225 - 300 g/hl	2-3 interventi: in fioritura, 15 / 20 giorni dopo, ingrossamento frutti.
Colture orticole: pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga, indivia, scarola, sedano, finocchio, etc.	300 - 350 g/hl	2 interventi fino alla in fioritura.
Ornamentali e floricole.	150 - 225 g/hl	Totalizzare minimo 2-3 interventi durante il ciclo di sviluppo.

MISCIBILITÀ
È compatibile con i più comuni agrofarmaci compreso rame e zolfo. In abbinamento con altri formulati, si consiglia di effettuare sempre piccole prove di saggio. **Agitare prima dell'uso**

Condizioni di magazzinaggio	Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente
	In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia Tenere fuori dalla portata dei bambini

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Peso netto Kg xxx
Lotto: xxxxx

IMBALLO

	1 PALLET TANICA 6Kg **30 SCATOLE = 120 T=720 Kg** **1 PALLET TANICA 25 Kg** **32 T= 800 Kg**		
TANICA 6Kg - 25Kg			**IBC 1250 Kg**