

## NA 18 N

### CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI N 18 in soluzione

#### Tenore dichiarato di nutrienti in massa

azoto (N) totale	18 %
azoto sotto forma nitrica	9,1 %
azoto sotto forma ammoniacale	8,9 %

#### Ingredienti

Nitrato ammonico (1) (CAS n° 6484-52-2)  
(1) CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

#### Caratteristiche Chimico-Fisiche

Aspetto	LIQUIDO INCOLORE
densità' apparente a 20 °C	1,22 – 1,30 Kg/lit
pH T.Q. (20 °C)	< 3.5
pH soluzione 1% (20 °C)	7.0
odore proprio	Debole

#### Uso e Dosi

NA 18 N si consiglia anche su piante a carenza di sviluppo vegetativo dovuto a postumi di malattie, danni da freddo, grandine, asfissia radicale, crisi da trapianto. È specifico anche per essere impiegato in abbinamento con diserbanti per attivarne l'azione, stimolando la crescita della pianta. Sono consigliati almeno 2 interventi durante il ciclo, modulare e/o aumentare con sviluppi e/o andamento stagionale avverso.

Vite da vino: dal germogliamento a fine allegagione Vite da tavola: dalla ripresa vegetativa al pieno accrescimento acini. Melo e Pero: da pre fioritura a fine allegagione, pre caduta foglie. Actinidia: da inizio germogliamento a fine allegagione, pre caduta foglie. Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio: dalla ripresa vegetativa a fine allegagione, pre caduta foglie. Agrumi: dalla ripresa vegetativa a fine allegagione. Olivo: da prefioritura a indurimento nocciolo. Fragola: dalla ripresa vegetativa a inizio fioritura e in fase di post attecchimento o trapianto. Pomodoro, Melanzana, Peperone, Cetriolo, Zucchini: da post trapianto a inizio allegagione primi frutti. Melone, Cocomero: da post trapianto a inizio allegagione. Patata: da emergenza a prefioritura. Ortaggi a foglia: dalle prime fasi alla massima espansione fogliare. Ortaggi in genere: trattare più volte nelle fasi critiche condizionanti la produzione e il risultato qualitativo. Barbabietola da zucchero: da emergenza a pieno sviluppo fogliare. Trattamenti Fogliari: dose di 350-450 ml/hl ogni 10-15 giorni. Il dosaggio è riferito per volumi d'acqua cosiddetti "normali". Intervenire nelle ore fresche. In abbinamento al diserbo con le microdosi (MDR) non superare 0,5 kg/Ha. Utilizzare i dosaggi minori per le colture sotto serra o tunnel, usare i dosaggi maggiori a pieno campo e per colture stressate.

Fertirrigazione: utilizzare 3÷7 kg/1000mq per intervento e modulare il dosaggio sulla base delle esigenze delle colture e della loro sensibilità alla salinità. È consigliato non superare la concentrazione del 3 ‰. Ripetere l'intervento ogni 7-14 giorni.

Dosi e modalità di applicazione sopra riportate sono da intendersi come raccomandazioni generali e che non tengono in considerazione eventuali condizioni pedoclimatiche particolari o limitazioni imposte dagli enti ufficiali. Rivolgersi al proprio consulente per adattare le dosi raccomandate al piano di fertilizzazione aziendale ed evitare quindi concimazioni eccessive e/o sprechi di nutrienti.

## Miscibilità

NA 18 N è miscibile con tutti i concimi fogliari e per fertirrigazione, fitofarmaci e diserbanti, a parte gli olii e i polisolfuri. Evitare di unirli ai fitofarmaci in forma concentrata e in poca acqua. Miscele con poltiglia bordolese devono essere utilizzate subito dopo la preparazione. Il prodotto in fase di conservazione teme il gelo persistente

## Condizioni di magazzinaggio



## Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente

In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia



**Attenzione**  
**Indicazioni di pericolo**  
 H319 Provoca grave irritazione oculare  
**Consigli di prudenza**  
 P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso  
 P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso  
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare  
 P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico  
**UFI : 4E20-30SH-700E-6R7W**

## Precursore di esplosivi soggetto a segnalazione ai sensi del Reg. (UE) 2019/1148.

Questo prodotto è disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore al punto di contatto nazionale competente.

**EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta**

## SOLO PER USO PROFESSIONALE

**Peso netto Kg xxx**

**Lotto: xxxxx**

## IMBALLO

	<p>1 PALLET TANICA 30 Kg 32 T= 960 Kg</p>			
<p><b>TANICA 30Kg</b></p>		<p><b>IBC 1200 Kg</b></p>		<p><b>ATB SFUSO</b></p>